

تحمي الغدد اللمفاوية الجسم ضد جميع أنواع الميكروبات، وهي من أكثر أنواع الغدد توّرّماً نتيجة لأسباب مختلفة تتراوح من البسيط وحتى الأمراض والأورام السرطانية

# توّرم الغدد اللمفاوية للأطفال متى يكون مقلقاً؟




قد تكون هناك أعراض أخرى تصاحب توّرم الغدد اللمفاوية (Getty)

**■ متى نقلق من انتفاخ وتورّم الغدد اللمفاوية للأطفال؟** من العلامات التي يراها الطبيب، وتدل على أن توّرم الغدد اللمفاوية عند الأطفال قد يكون شيئاً خطيراً:

- انتفاخ وتورّم الغدد اللمفاوية للأطفال في أكثر من مكان بالجسم.
- العقد اللمفاوية التي تكون صلبة أو قاسية.
- التهاب غير مؤلمة، بالإضافة لارتفاع أخرى مثل الحكة، وفقد الوزن، وتعرق الليلي، والكلحة، والإرهاق.
- العقد اللمفاوية الثابتة، أي يصعب تحريكها من أماكنها.
- العقد اللمفاوية التي يزيد حجمها عن 2,5 سم.
- العقد اللمفاوية غير المؤلمة.
- العقد اللمفاوية سريعة النمو.
- العقد اللمفاوية المتتفاكة المصاحبة بآعراض.
- المزيج من العقد اللمفاوية المتتفاكة، مع وجود شكوك داخلية بأن في أجساد أطفالكم شيئاً جديداً وخطيراً.

**■ ما مدة استمرار توّرم الغدد اللمفاوية للأطفال؟** من الممكن أن تأخذ العقد المتتفاكة من أسابيع إلى شهور كي تعود إلى حجمها الطبيعي، وبما أن الأطفال الأصغر عمراً من الممكن أن يصابوا بمعدل ست إلى ثمانين مرات بعد ولادتهم، ولكن النوع المعتمم لاعتلال الجهاز التنفسى العلوي كل عام، التي قد يكون مصاحباً للأمراض الجهازية التي تصيب أكثر من جهاز في الجسم.

## الالتهابات الفيروسية السبب الأكثر شيوعاً لتوّرم الغدد اللمفاوية للأطفال



## حواس آخر يجربها الطفل



تجاوز تجربة طفلك الحواس الشخصي، فهناك ثلاثة حواس آخر وهي:

- الاحساس بالتوازن والحركة، فيختبرها طفلك عندما يهتز أو يرتد.
- الاحساس العميق، يبدأ الأطفال بالتطوير الحسن العميق تدريجياً، مثل تقييم الطفل لجسمه بشكل آمن.
- الحس الداخلي، مثل الشعور بالجوع، وهو احساس لا ينطوي بشكل كامل عند الأطفال.

ويحيل الأطفال الذين يرضعون من الثدي إلى تفضيل الأطعمة التي عرفوها في أثناء الرضاعة الطبيعية.

ومجرد أن يأكل طفل الأطعمة الصلبة، يقترح الأطباء تعریضه لجموعة متنوعة من التكهنات في وقت مبكر، حتى يطور مذاقاً جيداً لعدد كبير من الأطعمة، وبهذا يصبح فيما بعد مقتلاً للطعام.

4. حاسة البصر: تبدأ رؤية طفلك في التطور في الأشهر الثلاثة الأولى، في نحو 7 إلى 11 أسبوع من الحمل، ويحلول الأسبوع 27 من الحمل، يمكنه أن يفتح عينيه، وفي الأسبوع 31 إلى 32 من الحمل، يستجيب الجنين للضوء، الساطع.

لكن، رؤية الطفل تبقى مشوشة عند الولادة، ومع تقدم الأشهر، يمكنه رؤية الأشياء البعيدة، والبلد، في تمييز الألوان.

5. حاسة اللمس: يبدأ السمع في التطور في وقت مبكر من الأسبوع 16 من الحمل، ويصبح أكثر دقة أثناء الحمل.

وقتها الرضاعة، وعم مرور الأشهر، تساعد حاسة السمع في تطوير اللغة عند الأطفال، ومن المفترض أن يخضع جميع المولود لاختبار السمع بعد الولادة بفترة وجيزة.

ومن علامات أن الطفل قد يكون ضعيف السمع أو أصم، عدم الاستجابة للأصوات العالية، وعدم تحويل رأسه إلى مصدر الصوت في عمر 6 أشهر، وعدم محاولة نطق كلمات بحلول السنة الثانية.

يعتقد البعض، عن خطأ، أن حواس الطفلخمس تتطور بعد الولادة مع أن بعضها يبدأ في النمو داخل الرحم، لذا نقدم شرحاً مبسطاً عن حواس الطفل، وأالية تطورها:



1. حاسة الشم: تبدأ مستقلات حاسة الشم في التطور في وقت مبكر من الأسبوع الثامن من الحمل، وتتطور وتتناضج ببلوغ الجنين الأسبوع 24 من الحمل، وبعد الولادة، يبدأ الأطفال بالتعلق بروائح مأهالهم التي تعيق بمثابة وسيلة تهدئة للرضيع عند وضعه على صدر أمها.
2. حاسة اللمس: تبدأ حاسة اللمس في التطور بمجرد بلوغ الحمل 8 أسابيع، وتتوفر حاسة اللمس لطفلك مشاعر الدفء، والأمان، لهذا تشجع الأمهات على احتضان الطفل كثيراً، وأن يلامس جلد الرضيع جلد والدته، وهذا مهم بشكل خاص للأطفال الخدج.
3. حاسة التذوق: تتطور برابع التذوق في وقت مبكر من الأسبوع الثامن من الحمل، وتعمل لدى طفلك بكامل طاقتها في الأسبوع 17 من الحمل تقريباً.

## إضاعة

## كيف تتطور حواس الطفل الخامس ومتى يتمكّن من استخدامها؟

### ذكرى الفيسني

يعتقد البعض، عن خطأ، أن حواس الطفلخمس تتطور بعد الولادة مع أن بعضها يبدأ في النمو داخل الرحم، لذا نقدم شرحاً مبسطاً عن حواس الطفل، وأالية تطورها:

1. حاسة الشم: تبدأ مستقلات حاسة الشم في التطور في وقت مبكر من الأسبوع الثامن من الحمل، وتتطور وتتناضج ببلوغ الجنين الأسبوع 24 من الحمل، وبعد الولادة، يبدأ الأطفال بالتعلق بروائح مأهالهم التي تعيق بمثابة وسيلة تهدئة للرضيع عند وضعه على صدر أمها.
2. حاسة اللمس: تبدأ حاسة اللمس في التطور بمجرد بلوغ الحمل 8 أسابيع، وتتوفر حاسة اللمس لطفلك مشاعر الدفء، والأمان، لهذا تشجع الأمهات على احتضان الطفل كثيراً، وأن يلامس جلد الرضيع جلد والدته، وهذا مهم بشكل خاص للأطفال الخدج.
3. حاسة التذوق: تتطور برابع التذوق في وقت مبكر من الأسبوع الثامن من الحمل، وتعمل لدى طفلك بكامل طاقتها في الأسبوع 17 من الحمل تقريباً.